

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE
JOSEPH BAUMANN,
HORTICULTEUR,

BREVETÉ DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Membre de l'Académie nationale agricole, manufacturière et commerciale de l'Empire français (Paris), et de plusieurs Académies et Sociétés scientifiques.

A LA NOUVELLE PROMENADE, N^{os} 5 ET 7,

A GAND (BELGIQUE).



PRIX-COURANT

DE

PLANTES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE, ETC.

(SANS RABAIS)

Pour l'Automne 1853.

N. B. Les conditions pour l'achat et le paiement sont les mêmes que par le passé.

Grandes spécialités des plantes de terre de bruyère, multipliées annuellement par greffes dans l'établissement.

10,000 Camellias, 10,000 Rhododendrons, 10,000 Azalées de l'Inde, 10,000 Azalées de l'Amérique (variétés de Mortier, de Gand).

Les Catalogues des susdites spécialités sont sous presse.

Ein Preis-Verzeichniss von Camellias, Azaleas indica und Azaleas punctata ist unter Pressen
und wird in kurzem erscheinen.



PLANTES DE SERRE CHAUDE.

ABUTILON insigne . . . 1 »	GARDENIA Fortunei . . . 2 50	GLOXINIA Roezl (B) . . . » 50
ÆCHMEA discolor . . . 5 »	— Stanleyana . . . 5 50	— rosea perfecta . . . 1 »
— fulgens . . . 4 »	GASTONIA palmata . . . 5 »	GUZMANNIA tricolor . . . 5 »
— miniata . . . 10 »	GESNERIA macrantha . . . 1 25	HEBECLINIUM janthinum . . . 1 50
ÆSCHYNANTHUS albus . . . 1 25	— zebрина aтерrima . . . 5 »	HEXACENTRIS mysorens. 6 à 10 »
— gracilis . . . 1 25	— — floribunda flava . . . 5 »	HIBISCUS spataceus . . . 5 »
— speciosus . . . 1 »	— — vespens . . . 5 »	HINDSIA longiflora . . . 5 50
— splendidus (magnif.) 2 50	— — viridis . . . 5 »	— — alba . . . 5 50
ALLAMANDA Cathartica . . . 2 »	— — marmorata . . . 5 »	HOYA bella . . . 2 »
— nerifolia . . . 1 »	— — obscura . . . 5 »	— — campanulata . . . 1 50
— Schottii . . . 1 50	— — picta . . . 5 »	— — coriacea . . . 5 »
— verticillata . . . 5 »	— — pulcherrima . . . 5 »	— — fraterna . . . 15 »
ANOECTOCYLUS argenteus 2 50	— — splendens . . . 1 »	— — imperialis . . . 5 à 5 »
— — pictus . . . 5 50	— — splendidissima 5 »	— — lacunosa . . . 5 50
— — setaceus . . . 25 »	— — viridis . . . 5 »	— — picta . . . 15 »
— — intermedius . . . 50 »	GLORIOSA Plantii . . . 10 »	— — suaveolens . . . 5 50
— — pictus . . . 50 »	GLOXINIA Alexandria . . . 2 »	— — variegata . . . 15 »
APHELANDRA aurantiaca . . . 10 »	— — Arthur . . . 1 »	IMPATIENS platypetala alba 1 »
— — cristata . . . 1 50	— — baronne de Vrièrè . . . 50 »	INGA Portimensis . . . 1 50
ARALIA jatrophæfolia . . . 25 »	— — Boyledieu . . . 50 »	— — splendidissima . . . 2 50
ARDISIA crenulata fructo	— — carminata splendens 1 »	— — roseo alba . . . 2 50
albo . . . 5 »	— — comtesse F. de Bo-	IPOMEA limbata . . . 5 50
BARBACENIA Rogierii . . . 5 »	carmé . . . » 50	IXORA Griffithii . . . 5 à 10 »
BEGONIA cinnabarina . . . 2 50	— — Potocki . . . » 50	— — javanica . . . 5 à 10 »
— — crassicaulis . . . 2 50	— — daphne . . . » 50	— — salicifolia . . . 5 à 10 »
— — excelsa . . . 1 25	— — delicata elegans . . . 1 »	JACARANDA caroba . . . 5 »
— — Hernandiflora . . . 10 »	— — Dmitri Davidoff . . . » 50	— — mimosaefolia . . . 5 50
— — Prestonensis . . . 5 »	— — Dumont d'Urville . . . » 50	KLUSIA zeylanica . . . 2 50
— — rubro-venia . . . 6 »	— — Frédéric Lennig . . . » 50	LUCULIA gratissima . . . 5 à 6 »
BESLERIA campanulata . . . 1 »	— — Général Baudrand . . . » 50	— — Pinceana . . . 5 à 6 »
BISSCHOFFIA javanica . . . 10 »	— — Godefroid de Bouil-	MAGNOLIA fragrantissima
BILLBERGIA Leopoldii . . . 5 »	lon . . . » 50	10 à 15 »
— — vittata . . . 5 »	— — grande duchesse	MALPIGIA coccifera . . . 2 »
BREXIA chrysophylla . . . 5 »	Hélène . . . » 50	MARANTA albo-lineata . . . 5 »
BROMELIA fastuosa . . . 5 »	— — Güttenberg . . . » 50	— — roseo-lineata . . . 8 à 10 »
BRUGMANSIA albedo-flava 5 »	— — Henri Decaisne . . . » 50	— — vittata . . . 8 à 10 »
CARAGUATA lingulata . . . 5 »	— — Joséphine Beau-	MARICA cœlestis grandifl. 1 50
CENTRADENIA divaricata . . . » 50	harnais . . . » 50	MEDINILLA Sieboldtii
CISSUS discolor . . . 2 »	— — Lapeyrouse . . . » 50	(eximea) 5 à 4 »
CLERODENDRUM sinuatum. 1 50	— — Léonie . . . 2 »	— — magnifica . . . 10 à 25 »
— — splendens (Knight) 2 50	— — Léopold 1 ^{er} . . . » 50	— — speciosa . . . 5 »
COMBRETUM macrophyllum 5 »	— — macrophylla rubra . . . » 50	NAPOLEONA imperialis . . . 5 »
— — Pinceanum . . . 5 »	— — madame Adanson . . . » 50	PASSIFLORA comte de Kiseloff » 50
CONVOLVULUS canariensis. 1 25	— — Bravy . . . » 50	— — de Nesselrode . . . » 50
COSTUS Verschaffeltianus 5 »	— — de Genlis . . . » 50	— — de Woronzow . . . » 50
CYRTOCERAS Paxtonii . . . 5 »	— — Quesnel . . . » 50	— — Decaisniana . . . 2 »
— — reflexa . . . 5 »	— — mad ^{elle} de Som-	— — laurifolia . . . 1 »
DIPLODENDRA atropurpurea 5 »	breuil . . . » 50	PAVETTA borbonica . . . 10 à 50 »
— — crassinoda . . . 5 50	— — Marie-Louise . . . 2 »	PHARBITES limbata (Ipomœa) 5 50
— — incarnata . . . 10 »	— — Van Houtte . . . » 50	PIPER magnoleaeifolium . . . 1 25
— — nobilis . . . 10 »	— — marginata splendens 2 »	PLECTRANTHUS concolor
— — splendens . . . 6 »	— — Mathilde . . . 2 »	picta . . . 1 »
— — urophylla . . . 4 »	— — Mendelsohn Bar-	PLEROMA elegans . . . 2 à 4 »
DIPTERACANTHUS spectabilis » 50	thold . . . 2 »	RHODOLEIA championi 25 à 50 »
DRACENA nobilis . . . 5 à 10 »	— — mercedes . . . » 50	RHOPALA corcovadensis . . . 25 »
ECHITES bicolor . . . 2 50	— — Napoléon . . . » 50	— — elegans . . . 5 à 10 »
— — caudata . . . 1 »	— — nobilis . . . 2 »	SARRACENIA purpurea . . . 5 »
— — Franciscea . . . 5 50	— — Petoiana . . . 1 »	SAURAJA setosa . . . 5 50
— — Harrissii . . . 25 »	— — Philippe Miller . . . » 50	SPATHODEA campanulata 5 à 10 »
— — Pellierii . . . 25 »	— — Prince Troubetzkoy 2 »	— — gigantea . . . 25 »
FICUS elastica . . . 5 »	— — Frédéric . . . 2 »	STACHYTARPHETA mutabilis 5 »
FRANCISCEA augusta . . . 2 »	— — Princesse Charlotte 1 »	STIFFTIA chrysantha . . . 2 »
— — confertiflora (laurif.) 5 »	— — Hélène . . . » 50	STROPHANTHUS Stanleyanus 1 50
— — eximia . . . 3 »	— — professeur Parlatore » 50	THEOPHRASTA latifolia . . . 10 »
— — hydrangæeformis . . . 2 50	— — Reine Louise . . . 1 »	TILLANDSIA splendens 4 à 5 »
		TYPNANTHE suberosa 2 à 4 »

PALMIERS.

LATANIA BORBONICA, (4 exemplaires, les plus forts pieds qui se trouvent en Belgique) la pièce fr. 600 »

PLANTES DE SERRE FROIDE.

N. B. Les plantes marquées d'une * sont de pleine terre.

<i>ABELIA uniflora</i> . . . 1 à 2 »	<i>BRACHYSEMA lanceolata</i> . . . 2 50	<i>DORYANTHES excelsa</i> . . . 5 »
<i>ABUTILON insigne</i> . . . 1 »	— <i>platyptera</i> . . . 2 »	— — fort . . . 25 à 50 »
<i>ACACIA albicans</i> . . . 1 50	— <i>præmorsa</i> . . . 1 50	* <i>ELEAGNUS macrophylla</i> . . . 1 »
— <i>binerva</i> . . . 1 50	— <i>versicolor</i> . . . 2 50	<i>ELICHRYSUM aphelexis</i> . . . 2 »
— <i>deltoides</i> . . . 2 »	<i>BROWALEA Jamesoni</i> . . . 1 »	— <i>humilis</i> . . . 1 »
— <i>dilvara</i> . . . 2 »	— <i>speciosa</i> . . . 1 »	— <i>rosea macrantha</i> . . . 2 »
— <i>Douglasii</i> . . . 1 50	<i>BRUGMANSIA sanguinea</i> . . . 1 »	<i>ENKYANTHUS quinquefolius</i> . . . 5 »
— <i>Drummondii</i> . . . 5 »	<i>BRYANTHUS erectus</i> . . . 10 »	<i>EPACRIS</i> (en collection) la
— <i>eriocarpa</i> . . . 10 »	<i>BURCHELIA speciosa</i> . . . 1 »	pièce : 2 à 5 »
— <i>frondosa</i> . . . 1 50	<i>BURTONIA violacea</i> . . . 5 »	<i>ERICA</i> . La collection de 25
— <i>grandis</i> . . . 6 »	<i>CALCEOLARIA violacea</i> . . . 4 à 5 »	à 50 variétés très distin-
— <i>incrassata</i> . . . 2 »	* <i>CALYCANTHUS macrophyl-</i>	— <i>à fleurir</i> , la pièce : 5 »
— <i>ixiophylla</i> . . . 1 »	— — <i>lus</i> 1 à 2 »	<i>ERIOSTEMON buxifolius</i> , fort 5 »
— <i>juniperina</i> . . . 50	— — <i>les 12</i> . . . 8 »	— <i>densifolius</i> . . . 6 »
— <i>linearis</i> . . . 1 »	<i>CANTUA bicolor</i> . . . 1 »	— <i>intermedius</i> . . . 5 »
— <i>Mirbelii</i> . . . 5 »	— <i>dependens</i> . . . 50	— <i>linariifolium</i> . . . 10 »
— <i>oleifolia elegans</i> . . . 5 »	— <i>pyrifolia</i> . . . 50	— <i>myoporoides</i> . . . 1 »
— <i>oxycedrus</i> . . . 50	* <i>CARINOCARPUS lævigatus</i> . . . 1 »	— <i>nerifolius</i> . . . 2 »
— <i>platyptera</i> . . . 50	<i>CEANTHUS dentatus</i> . . . 1 »	— <i>obtusum</i> . . . 10 »
— <i>prostrata</i> . . . 1 »	— <i>papillosus</i> . . . 2 »	— <i>pulchellum</i> . . . 5 »
— <i>pulchella elegans</i> . . . 2 »	— <i>rigidus</i> . . . 2 »	— <i>scaber</i> . . . 2 »
— <i>repens</i> . . . 1 »	— <i>thyrsiflorus</i> . . . 1 »	<i>ERYTHRINA cafra</i> . . . 2 »
— <i>rotundifolia</i> . . . 50	<i>CHIRONIA grandiflorus</i> . . . 1 »	<i>ESCALLONIA grandiflora</i> . . . 2 »
— <i>sinuata</i> . . . 5 »	<i>CHORILENA myoporoides</i> . . . 1 »	— <i>macrantha</i> . . . 1 »
— <i>vestita</i> . . . 2 »	<i>CHOROZEMA Chandlerii</i> . . . 1 »	— — <i>les douze</i> . . . 6 »
<i>ACROPHYLLUM venosum</i> . . . 15 »	— <i>cordatum majus</i> . . . 2 »	<i>EUCALYPTUS obcordatus</i> . . . 1 »
<i>ADAMIA versicolor</i> . . . 2 »	— <i>elegans multiflorum</i> . . . 1 »	— <i>obovata</i> . . . 5 »
— <i>cyanea</i> . . . 1 »	— <i>ericoides</i> . . . 1 »	* <i>EUVONYMUS fimbriatus</i> . . . 1 »
<i>ADENANDRA ciliata</i> . . . 1 »	— <i>flavum</i> . . . 1 »	<i>FAGELIA bituminosa</i> . . . 5 »
<i>ÆNOPTERIS glandulosa</i> . . . 8 à 10 »	— <i>Henchmannii</i> . . . 2 50	<i>FUCHSIA</i> (en collect.) la pièce » 50
<i>AGNOSTUS integrifolius</i> . . . 15 »	— <i>oppositifolium</i> . . . 2 »	* <i>GARRAYA laurifolia</i> . . . 2 »
— <i>sinuatus</i> . . . 10 à 15 »	— <i>spectabile</i> . . . 1 »	* — <i>Macphadyana</i> . . . 5 »
<i>AMPHICOMA arguta</i> . . . 1 »	— <i>splendens</i> . . . 1 »	<i>GASTROLOBUM acutum</i> . . . 2 »
<i>AOTUS gracilis</i> . . . 1 »	— <i>varium Chandlerii</i> . . . 1 »	— <i>Brownii</i> . . . 2 »
<i>ARALIA crassifolia</i> . . . 15 »	— — <i>nanum</i> . . . 1 »	— <i>cuneatum</i> . . . 5 »
— <i>integrifolia</i> . . . 25 »	<i>CINERARIA</i> (en collection)	— <i>epacridioides</i> . . . 2 »
— <i>jatrophaefolia</i> . . . 25 »	la pièce. » 50	— <i>retusum</i> . . . 1 »
— <i>quinquefolia</i> . . . 5 à 10 »	* <i>CLEMATIS azurea grandifl.</i> . . . 1 »	<i>GENETHYLIS tulipifera</i> . . . 10 »
— <i>Shefferii</i> . . . 10 »	* — <i>bicolor</i> . . . 1 »	* <i>GLYCINE sinensis alba</i> 15 à 25 »
— <i>trifoliata</i> , fort . . . 5 à 10 »	* — <i>sophia</i> . . . 5 à 10 »	<i>GNIDIA lævigata</i> . . . 2 »
— — très fort . . . 25 à 50 »	— <i>trifoliata</i> . . . 1 »	— <i>pinifolia</i> . . . 2 »
<i>ARISEMA ringens</i> . . . 1 »	<i>CLERODENDRON foetidum</i> . . . 5 »	<i>GORDONIA javanica</i> . . . 5 »
<i>BALSAMINEA latifolia alba</i> . . . 1 »	<i>CLETHRA macrophylla</i> . . . 5 »	<i>GREVILLEA flexuosa</i> , fort. 15 »
<i>BEAUFORTIA sparsa</i> . . . 2 »	* <i>CLEYERA japonica</i> . . . 1 »	— <i>robusta</i> . . . 5 à 10 »
<i>BLANDFORDIA grandiflora</i> . . . 25 »	<i>CLIVEA nobilis</i> . . . 1 »	— <i>rosea</i> . . . 5 à 10 »
— <i>nobilis</i> , fort. . . . 15 »	<i>CONVOLVULUS canariensis</i> . . . 1 »	— <i>verticillata</i> . . . 5 à 6 »
<i>BOMARIA edulis</i> . . . 5 à 5 »	— <i>siphorpii</i> . . . 1 »	<i>HABROTHAMUS magnificus</i> . . . 5 »
<i>BONAPARTEA filamentosa</i> ,	<i>CROWEA saligna</i> . . . 1 »	— <i>tomentosus</i> . . . 5 »
fort. . . . 50 »	— <i>erecta</i> . . . 4 »	<i>HAKEA cristata</i> . . . 1 »
— <i>gracilis</i> . . . 10 »	<i>CYTISUS onosperma</i> . . . 5 à 6 »	— <i>cucullata</i> . . . 2 »
— <i>junceae</i> . . . 2 à 3 »	<i>DAPHNE Fortunei</i> . . . 2 »	— <i>macrophylla</i> . . . 1 »
<i>BORONIA anemonæfolia</i> . . . 2 »	— <i>foliis atropurpureis</i> . . . 2 »	— <i>repanda</i> . . . 1 »
— <i>Drummondii</i> . . . 10 »	— <i>japonica vera</i> . . . 2 »	— <i>saligna</i> . . . 1 »
— <i>Mollinii</i> . . . 2 »	<i>DAVIESIA scolopendroides</i> 10 »	— <i>Victoriæ</i> . . . 4 »
— <i>polygalæfolia</i> . . . 1 25 »	<i>DIANTHUS arboreus</i> . . . 1 »	<i>HARDENBERGIA ovata alba</i> . . . 5 »
— <i>tetandra</i> . . . 2 »	<i>DILLWYNIA rudis sanguinea</i> 1 »	<i>HELIOTROPISM cælestina</i>
<i>BOSSIAE microphylla</i> . . . 2 50	<i>DIOSMA fragrans</i> . . . 1 »	— <i>phytopala</i> . . . 2 »
<i>BRACHYSEMA acuminata</i> . . . 5 50		— <i>Gem</i> » 50

HELIOTROPIMUM immortalité
de Louise-Marie . . . 1 »
— lilacina . . . 1 »
— Louis Chaix . . . 2 »
— Lucien Tardif . . . 1 »
— Madame Boucharlat . . . 2 »
— submolle . . . 5 »
— Voltaireanum nanum . . . 1 »

HEMADRUM pungens . . . 2 »
*HYDRANGEA japonica fol.

argent. var. . . 5 »

ILICIMUM religiosum . . . 1 »

INDIGOFERA decora . . . 1 »

INGA pulcherrima . . . 1 »

IPSOPOGON Loudonii . . . 5 »

JASMINUM gracile . . . 1 »

— nudiflorum . . . 1 »

JELSIUM nitidum . . . 2 »

*KADSURA japonica . . . 1 »

KENNEDYA coccinea vera . . . 1 »

— longiracemosa . . . 1 »

— Maryattæ . . . 1 »

— rubicunda . . . 1 »

— superba . . . 1 »

LAMBERTIA formosa . . . 1 »

LANTANA alba grandiflora . . . 2 »

— delicatissima . . . 2 »

— flavicoma . . . 2 »

— luteo superba . . . 2 »

— Youngii . . . 1 »

LECHENAULTA larixifolia . . . 1 »

LEIOSPERMUM racemosum . . . 1 »

LEUCOPOGON juniperinus . . . 2 »

*LINDLEYA mespiloides . . . 2 »

LOBELIA thapsioidea . . . 50 »

LOMATIA ferruginea . . . 20 »

— ilicifolia . . . 2 »

— longifolia . . . 2 »

— silaifolia . . . 3 »

MAGNOLIA fuscata . . . 2 »

— pumila . . . 3 »

METROSIDEROS crassifolia . . . 2 »

— robusta . . . 1 »

— viridiflorus . . . 1 »

MIRBELIA dilatata . . . 3 »

— ericæfolia . . . 4 »

— ilicifolia . . . 5 »

MITRARIA coccinea . . . 50 »

— — les douze . . . 5 »

MYRTUS bullata . . . 1 »

— tenuifolia . . . 1 »

*NEILLIA thyrsiflora . . . 5 »

*NEYRICA californica . . . 5 »

OXYLOBUM calycinum . . . 4 »

— ovalifolium . . . 5 »

— Pultenæa . . . 50 »

PARSONIA linearis . . . 1 »

PARTONIA pulchella . . . 2 »

PENTLANDIA miniata . . . 1 »

PERNETTIA angustifolia . . . 1 »

PETUNIA (en collection),
la pièce : . . . 50 »

PEUMUS fragrans . . . 1 »

*PHYLESIA buxifolia (ma-
gnifique) . . . 10 à 50 »

PHYSOLOBIUM carinatum . . . 1 »

— gracile . . . 1 »

PIMELEA decussata rubra . . . 1 »

— gnidia . . . 4 »

— Hendersonii . . . 1 »

— macrocephala . . . 5 »

— multiflora rubra . . . 2 »

— Neippergiana . . . 1 à 2 »

— spectabilis . . . 1 »

— tinctoria . . . 6 »

— Verschaffeltiana . . . 1 »

PLATYLOBUM Murrayanum . . . 5 »

— triangulare . . . 2 »

PODOLOBIUM staurophyllum . . . 5 »

POLYGALA Dalmaisiana . . . 50 »

PRIMULA sinensis alba plena . . . 5 »

— — rubra plena . . . 4 »

PULTENÆA daphnoides . . . 1 »

— ericæfolia . . . 2 »

QUADRIA heterophylla . . . 8 »

RHOPALA corcovadensis . . . 25 »

— elegans . . . 5 à 10 »

ROELLIA ciliata . . . 2 »

*RYNCHOSPERMUM jismi-
noides . . . 2 »

*SKIMMIA japonica . . . 20 »

SOLLYA Drummundii . . . 1 »

*SPIRÆA callosa . . . 1 »

STAPHYLLIA colchica . . . 2 »

STATICE Fortuneii . . . 5 »

— Holfordii, fort. . . 12 »

— macrophylla, fort. 8 à 10 »

SWAINSONIA Osbornii . . . 2 »

SYPHOCAMPYLUS amœnus . . . 1 »

— coccineus . . . 50 »

— nitidus . . . 50 »

TACSONIA manicata . . . 2 »

— mollissima . . . 1 »

— pinnatifida . . . 1 »

TASMANNIA aromatica . . . 5 à 5 »

TEHLIA fuchsoides . . . 50 »

TELOPEA speciosissima,
fort. 20 à 25 »

TEMPLETONIA glauca . . . 1 »

TESTUDINARIA elephanti-
pes . . . 10 »

TETRATHECA verticillata . . . 1 à 2 »

THEA bohea . . . 1 »

— viridis . . . 1 »

THYSANOTUS lilacinus . . . 20 »

— proliferus . . . 5 à 10 »

TORENIA asiatica . . . 50 »

— bicolor . . . 1 »

TREMANDRA verticillata . . . 1 »

TROPEOLUM triomphe de
Gand . . . 50 »

— Wagnerianum . . . 2 »

TURNERA elegans . . . 1 »

TUSSILAGO japonica, fort. . . 2 »

VACCINIUM niveum . . . 50 »

— Rollissonii . . . 10 à 20 »

VERBENA (en collection),
la pièce : . . . 50 »

VERONICA Andersonii . . . 50 »

— coccinea . . . 1 »

— formosa . . . 50 »

— salicifolia vera . . . 50 »

— speciosa fol. arg.
var. . . 5 à 10 »

— — rubra . . . 1 »

VIBURNUM grandiflorum . . . 5 à 10 »

— Hartwegianum . . . 4 »

— macrocephalum (la
vraie espèce). 10 à 25 »

— plicatum . . . 5 »

— suspensum . . . 2 »

WEIMANNIA pubescens . . . 2 »

*WEIGELIA Metelerkampii . . . 5 »

WITEMSEA corymbosa . . . 2 »

— — très fort . . . 10 »

XANTHOSIA rotundifolia . . . 50 »

Rhododendrum de pleine terre (forts, en boutons).

100 Rhod. azaloides	fr. 80 à 100	100 Rhod. ponticum	55 à 75
100 — dauricum	80 à 800	100 — punctatum	80 à 100
100 — ferrugineum	80 à 100	100 — Vervaeckianum fl. pl., de 15, 20 à 25 boutons	500 à 600
100 — hirsutum	80 à 100		

Kalmia (en boutons).

100 Kalmia angustifolia (forts)	80 à 100	100 Kalmia media	80 à 100
100 — glauca	80 à 100	100 — pumila	80 à 100
100 Kalmia latifolia (forts, sans boutons)			80 à 100